

Broedseizoen sterns begonnen



De stern is een van de meest elegante en behendige zeevogels.

ORANJESTAD — Het broedseizoen van de sterns is aangebroken. Op Aruba nestelen ieder jaar circa tien soorten sterns, waarvan er vier behoren tot regionaal en mondiaal bedreigde soorten. Omdat Directie Landbouw, Veeteelt, Visserij en Markthallen (LVVM) al enige jaren een teruggang in mogelijke broedplaatsen waarneemt, vraagt ze aandacht voor de stern en de bedreigingen hier op het eiland.

Sterns zijn ranke zeevogels die prachtige manoeuvres kunnen uitvoeren in de lucht. Het is ook een soort die tijdens het broeden rust nodig heeft. Het broedseizoen van de stern loopt op Aruba van maart tot augustus. Van de soorten die hier waar te nemen zijn, komt de bonte stern (*sterna fuscata*) het meest voor. Voor de geelsnavelstern (*sterna sandvicensis eurygnatha*) is Aruba een belangrijk broedgebied. Deskundigen schatten dat zo'n 20 procent van de wereldpopulatie van deze vogelsoort hier broedt. De sterns die door recreanten aan de noordkust worden ge-

zien, zijn veelal dwergsterns (*sterna albifrons*).

MEEUW

In het broedseizoen zijn de vogels en hun kroost extra kwetsbaar. Van de natuurlijke bedreigingen is de meeuw (*larus atricilla*) de belangrijkste. De meeuw broedt tussen de sterns, niet vanwege de gezelligheid, maar omdat ze graag sterneieren eten en omdat ze graag een graantje meepikken van de visjes die de oudersterns aan hun kuikens proberen te voeren. Een van beide ouders blijft daarom op het nest om te voorkomen dat meeuwen hun jongen opeten, maar op

het moment dat de mens uit onwetendheid of onoplettendheid de sterns van hun nesten verjaagt, staat het broedsel bloot aan het grote risico om door meeuwen te worden aangevallen.

De belangrijkste niet-natuurlijke bedreiging vormt dan ook de mens. De meeste sternsoorten broeden op de rifeilanden, omdat zij daar meer rust vinden. Doordat er steeds grotere delen van de kust worden gebruikt voor de bouw van hotels en horeca, komt er aan de kust echter steeds minder plaats voor broedkolonies voor de stern.

In 2005 ontdekte LVVM een broedplaats met achtergelaten kuikens op een van de riffen. De broedplek was dicht bij een vissershut. Vorig jaar werd melding gemaakt van illegale houtkap op een rif. De boom behoort tot de soort waarin de bruine noddy (*anous stolidus*)

nestelt. Bij Malmok was een plaats waar sterns overdag uitrustten van hun zeetochten, maar al twee jaar ziet LVVM geen sterns meer op die plaats. Wel worden er steeds meer recreanten in en om het water waargenomen. Niet alleen de mens, maar ook zijn voertuigen vormen een bedreiging. Vroeger nestelden sterns achter de vuurtoren, maar vanwege het toegenomen verkeer doen zij dat daar niet meer. Een paar jaar geleden waren er meldingen van vernieling van nesten van de dwergstern. Auto's die over de duinen zouden hebben gereden, zouden de nesten hebben vernield. LVVM beschikt niet over cijfers, maar gaat ervan uit dat het rapen van sterneieren afneemt. Maar ook dit vormt nog een bedreiging.

GASTEN

In de Paasperiode gaan veel mensen kamperen om uit te

rusten. Sterns hebben ook rust nodig om hun eieren uit te broeden en de kuikens te laten opgroeien, zodat zij mee terug kunnen vliegen als het broedseizoen is afgelopen. LVVM vraagt kampeers daarom om niet alleen te genieten van de aanwezigheid van de sterns, maar ook om ze niet te benaderen. Het advies is om afstand van deze vogels te houden en uit hun gedrag op te maken of er in de buurt een nest zit. Als sterns op mensen afvliegen, dan betekent dit dat zij zich bedreigd voelen. LVVM hoopt dat de sterns meer worden gerespecteerd en dat hun broedkolonies met rust worden gelaten.

Wandel en geniet van de vele verschillende soorten, maar handel bedachtzaam en parkeer de auto in ieder geval zo ver mogelijk van plaatsen waar zich een kolonie kan bevinden, aldus LVVM.